

**Retina Institute of Virginia**  
8700 Stony Point Parkway, Suite 150  
Richmond, VA 23235  
(804) 644-7478 Toll-Free (877) 348-3937

*Ali Tabassian, M.D., Ph.D., Medical Director*  
*Juan A. Astruc, Jr., M.D.*  
*J. Steward O'Keefe, M.D.*

### **PARA CUIDARSE DESPUÉS DE LA CIRUGÍA**

En el ojo que tuvo la operación estará un protector después de la cirugía. Por favor no lo quite usted por sí misma. Lo quitará durante su próxima visita al médico el día siguiente.

Si les da una pulsera que indica que recibió usted una burbuja de gas durante la cirugía, por favor continúe llevarla hasta que se indique que deba usted quitarla.

Después de su primera visita después de la cirugía puede usted lavar sus párpados con mucho cuidado y ligeramente con agua tibia y con una tela limpia. Se puede usted ducharse o bañarse, pero no permita que le entre espuma de jabón en el ojo.

Después de la cirugía, puede usted tomar todas las medicinas que toma usted normalmente. También puede tomar Tylenol o ibuprofeno para aliviar el dolor si no tiene usted algún tipo de alergias a estas medicinas.

**\*\*Si dolor intenso o mareo ocurre, comuníquese con nuestro consultorio inmediatamente.**

### **TOME TODAS LAS MEDICACIONES NUEVAS PARA SU OJO, COMO INDICADO, DESPUÉS DE SU PRIMERA VISITA AL MÉDICO HASTA QUE LES HA TERMINADO:**

- Econopred Plus 1% - Ponga una gota en el ojo afectado cuatro veces al día
- Antibiotic drop – Ponga una gota en el ojo afectado cuatro veces al día
- Tome todas las otras medicinas para el ojo afectado como antes de su cirugía, a menos que se indique de alguna otra manera su médico.
- Cuando usando el colirio, espere 5 minutos entre cada gota.
- No es necesario volver a llenar la prescripción a menos que se indique de alguna otra manera su médico. Por favor lleve todas las medicaciones consigo a cada visita con el médico.

\_\_\_\_\_  
Firma del paciente/representativo

\_\_\_\_\_  
Firma del médico/enfermera

\_\_\_\_\_  
Fecha